

SILIMAG LABITECH
Fertilizante orgánico mineral
Líquido concentrado (LC)

PROPIEDADES DE LA FORMULACIÓN

Silimag Labitech es un fertilizante orgánico mineral líquido formulado a base de sílice, potasio, magnesio y zinc, enriquecido con gluconatos y glucosaminas, aminoácidos y azúcares energizantes que activan la fotosíntesis, fortifican las paredes celulares, además de activar las defensas naturales y conservar la gradiente hídrica de los tejidos.

REGISTRO

254-F-AGR-P.

PRESENTACIONES

Envase x 100, 250, 500 ml, 1, 4, 20 l.



COMPOSICIÓN

% p/v		%p/v	
Sílice (SiO ₂)	5,5	Tirosina	0,57
Potacio (K ₂ O)	13	Valina	0,04
Magnesio (MgO)	4	Metionina	0,01
Potasio gluconato	15	Fenilalanina	0,03
Magnesio gluconato	12	Isoleucina	0,01
Ácido aspártico	0,07	Leucina	0,01
Ácido glutámico	1,01	Lisina	0,09
Serina	0,01	Aminoácidos totales	3,78
Histidina	0,13	Proteína total	3,5
Treonina	0,27	Azucares totales	12
Glicina	0,08	Materia orgánica	11,65
Arginina	0,2	Carbón orgánico	6,76
Alanina	0,62	Relación carbono/nitrógeno	19,31



MODO DE ACCIÓN

Hay un incremento de la biomasa, no solo por la conservación del agua, sino porque la sílica, en la hoja, incide en el aumento de la luz captada, lo que incrementa la eficiencia de la actividad fotosintética. Recomendado en cultivos de arroz, caña de azúcar, pastos, cereales, hortalizas, flores y frutas, para incrementar el movimiento de los nutrientes, retenerla capacidad hídrica, estimular las defensas naturales e incrementar la masa vegetal con aumento de los procesos fotosintéticos.

MODO DE EMPLEO

Agregue el producto al volumen de agua requerido. Mezcle y aplique abundantemente por aspersión o drench durante el día en que fue preparada. No aplicar cuando está lloviendo. Puede aplicar cada 7-15 días cuando se haya detectado la necesidad de su uso en cultivos que crecen en suelos con poca sílice.

DOSIS DE APLICACIÓN

Seguir las recomendaciones de uso.

RECOMENDACIONES DE USO SILIMAG LABITECH			
CULTIVO	DOSIS l/ha	EPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	1 - 2	En desarrollo vegetativo, floración y emisión de racimo.	REALIZAR 3 -5 APLICACIONES FOLIARES O AL SUELO (FERTIRRIEGO O DRENCH)
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	1 - 2	luego del trasplante, macollo, floración y madurez lechosa.	
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	2 - 3	En brotación, desarrollo, floración, fructificación y engrose.	
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	2 - 3	Luego de trasplante, prefloración, floración y fructificación.	
Melón (<i>Cucumis pepo</i>)	1 - 2	Luego de trasplante, prefloración, floración y fructificación.	
Fréjol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	1 - 2	En desarrollo, floración, y formación de vainas.	
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Italica</i>)	1 - 2	Luego del trasplante, en floración y formación de pella.	
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	1 - 2	Luego del trasplante, formación de bulbo y engrose.	
Frutilla (<i>Fragaria vesca</i>)	2 - 3	Luego de trasplante, prefloración, floración y fructificación.	
Manzana (<i>Malus doméstica</i>)	1 - 2	En brotación y desarrollo de yemas, floración, fructificación.	
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	2 - 3	En brotación y desarrollo de yemas, floración, fructificación.	
Limón (<i>Citrus</i> sp.)	2 - 3	En brotación y desarrollo de yemas, floración, fructificación.	
Palma africana (<i>Elaeis guineensis</i>)	2 - 3	En prefloración, floración y formación de racimo.	
Rosas (<i>Rosa</i> sp)	3	Luego del pinch, brotación de yemas y formación de botón.	



FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda utilizarlo al inicio del cultivo (brotación o trasplante), al inicio de la floración para favorecer la fecundación y desarrollo del fruto, así como también en la etapa de engrose y maduración de los frutos.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR

LABITECH CÍA LTDA.

Av. Jaime Roldós Aguilera N14-122, Teléfono: (593) 22424570

Dr CASP 24 06



(593) 22 424570



grupopharma@grpharma.com.ec



@GrpharmaEcuador

